

Wichtige Informationen

Wenn Sie mit der Pille, der „3-Monats-Spritze“, dem Verhütungspflaster oder dem Vaginalring verhüten wollen, sollten Sie am OP-Tag oder am nächsten Tag damit beginnen.

Sexuelle Aktivitäten können Sie wieder aufnehmen, wenn Sie sich gut dabei fühlen. Bitte denken Sie daran, dass Sie bereits 10 Tage nach dem Abbruch wieder schwanger werden können.

Wir beraten Sie gern zu Fragen der Verhütung und Familienplanung in unserem Zentrum!

Nicht normal sind:

- anhaltende, erheblich mehr als regelstarke Blutungen
- anhaltende oder erneut auftretende, heftige Unterbauchschmerzen
- anhaltendes Fieber über 38,5°C.

In diesen Fällen rufen Sie uns bitte an! Sie erhalten die Telefonnummer unseres Rufbereitschaftstelefons.

Nachuntersuchung

Nach der nächsten Regelblutung sollte eine Kontrolluntersuchung bei einer Ärzt*in Ihrer Wahl durchgeführt werden.

Zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt ist die Nachuntersuchung nicht sinnvoll, da die Rückbildungsvorgänge der Gebärmutter eventuell noch nicht abgeschlossen sind.

Ihre Unterstützung ist gefragt!

Sollte es zu Problemen kommen, die mit dem Schwangerschaftsabbruch in Zusammenhang gebracht werden können, informieren Sie uns bitte. Auf diese Weise können wir unsere Qualitätsstandards überprüfen und anpassen.



Familienplanungszentrum

BALANCE

Familienplanungszentrum BALANCE
Konrad-Wolf-Straße 12/12A, 1. Etage
13055 Berlin-Lichtenberg

Telefon 030 / 236 236 80
Fax 030 / 236 236 880
E-Mail medizin@fpz-berlin.de
Web www.fpz-berlin.de

Tram M5 Oberseestraße | M27 Alt-Hohenschönhausen
Bus 256 & 294 Konrad-Wolf-Straße

Ein barrierefreier Zugang mit Aufzug ist vorhanden.

Terminvereinbarung

Montag und Mittwoch	09:00 – 15:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag	09:00 – 16:00 Uhr
Freitag	09:00 – 14:00 Uhr

INFORMATIONEN ZUM ABLAUF DES OPERATIVEN SCHWANGERSCHAFTS- ABBRUCHS



**Hier online
Termin buchen
über Doctolib!**



Familienplanungszentrum

BALANCE

Wichtige Informationen zum organisatorischen Ablauf des operativen Schwangerschaftsabbruchs

Bitte lesen Sie diese Information in Ruhe durch.

Voruntersuchung und Aufklärungsgespräch im Familienplanungszentrum BALANCE

Zu diesem Termin bringen Sie bitte mit:

- Bescheinigung über die Pflichtberatung gemäß §219 Abs. 2 StGB (**3 Tage Bedenkfrist beachten!**)
- Krankenversicherungskarte
- Kostenübernahmeschein von einer Krankenkasse bzw. Betrag in bar oder per EC-Karte
- Für Nicht-Versicherte: Betrag in bar oder per EC-Karte
- Schriftlicher Blutgruppennachweis (z.B. Schwangerschaftspass, Blutspende- oder Notfallausweis) sofern vorhanden oder 10,00 € in bar oder per EC-Karte für den Test zum Nachweis des Rhesusfaktors

Die Kosten für den Schwangerschaftsabbruch tragen Sie selbst, es sei denn, Sie verfügen über ein geringes Einkommen und sind in Deutschland gemeldet. Dann können Sie einen Antrag zur Kostenübernahme bei einer gesetzlichen Krankenkasse stellen.

Cytotec®-Anwendung

Cytotec®-Tabletten öffnen den Muttermund und erleichtern so den Eingriff.

Dieses Medikament wird vor dem Eingriff entweder vaginal angewendet oder unter die Zunge gelegt.

Sie bekommen das Medikament bei der Voruntersuchung von der Ärzt*in ausgehändigt. An diesem Tag wird Ihnen auch der OP-Termin mitgeteilt.

Entscheiden Sie sich nach der Einnahme des Cytotec® **gegen** den Schwangerschaftsabbruch, **kann** Cytotec® eine Fehlgeburt einleiten bzw. beim Weiterbestehen der Schwangerschaft eine Schädigung des Feten verursachen!

OP-Tag in der Klinik am Schlosspark Biesdorf

Der Eingriff findet in der folgenden Adresse statt:

Klinik am Schlosspark Biesdorf
Elsterwerdaer Platz 1, 2. Etage im Westflügel
12685 Berlin

Ein*e Mitarbeiter*in überprüft Ihre Unterlagen und klärt noch mögliche Fragen und Sachverhalte. Die Anästhesist*in bespricht mit Ihnen in Ruhe alle Fragen zur Narkose.

Zu diesem Termin bringen Sie bitte mit:

1. Krankenversicherungskarte
2. Anästhesiebogen mit Überweisungsschein, den Sie von uns bei der Voruntersuchung erhalten haben
3. Handtuch, knielanges T-Shirt, Socken, Damenbinden und eine Unterhose

Bei geplanter Vollnarkose dürfen Sie 6 Stunden vor dem Eingriff nichts mehr essen, nichts trinken (auch kein Wasser), nicht rauchen, kein Bonbon lutschen und keinen Kaugummi kauen.

Wir bitten Sie, am Abend vor dem Eingriff oder am Morgen zu duschen.

Vor dem Eingriff wird die Vagina mit einer Lösung desinfiziert. Der Gebärmuttermund wird unter Narkose mit dünnen Stäbchen etwas aufgedehnt. Anschließend wird das Schwangerschaftsgewebe mit einem Röhrchen abgesaugt. Der Eingriff dauert nur wenige Minuten. Abschließend wird zur Sicherheit noch eine Ultraschalluntersuchung gemacht.

Falls Sie das Einlegen einer Spirale wünschen, kann dies im Anschluss an den Eingriff erfolgen. In diesem Fall teilen Sie uns dies bitte bei der Voruntersuchung mit!

Sobald die Gebärmutter leer ist, zieht sie sich kräftig zusammen, wodurch vorübergehend periodenähnliche Beschwerden auftreten können.

Nach dem Eingriff

Nach der OP müssen Sie von Ihrer Begleitung abgeholt werden: Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es unbedingt erforderlich, dass Sie von einer erwachsenen Person nach Hause begleitet werden!

Sie dürfen nach dem Eingriff kein Fahrzeug (Auto/Fahrrad) führen und sollten den Rest des Tages nicht alleine verbringen.

Nach dem Schwangerschaftsabbruch sollten Sie sich einige Tage schonen. Sie müssen aber nicht „das Bett hüten“. Bei Bedarf stellen wir Ihnen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus.

Die Schwangerschaftssymptome (z.B. Übelkeit, Spannen in der Brust) verschwinden meist innerhalb weniger Tage. Der Schwangerschaftstest kann noch bis zu 3–4 Wochen positiv sein!

Blutungen nach dem Abbruch sind sehr unterschiedlich. Sowohl eine schwache Schmierblutung als auch eine starke Menstruationsblutung sind in den ersten 4–5 Tagen normal. Insgesamt kann die Blutung 2–3 Wochen dauern. Die Blutung wird mit der Zeit immer schwächer.

Die erste Monatsblutung (Periode) ist 4–6 Wochen nach dem Abbruch zu erwarten.

Unterbauchbeschwerden sind normal und zeigen an, dass sich die Gebärmutter gut zusammenzieht. Ausreichend Bewegung hilft dabei. Gelegentlich treten Temperaturen bis 38°C auf. Diese Symptome sind normal.

Ansonsten können Sie ihren normalen Aktivitäten nachgehen. Sie dürfen duschen, aber nicht baden und sollten für ca. 5 Tage keine Tampons benutzen.

Wenn Sie ein Medikament gegen Schmerzen benötigen, kaufen Sie sich rezeptfrei „Ibuprofen 400“ oder „Paracetamol 500“. Nehmen Sie bitte **kein Aspirin®** (Wirkstoff: ASS – Acetylsalicylsäure) ein, da dieses Medikament die Blutung verstärken kann.